

“ALTO, LEA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

La persona que maneje el producto, debe usar equipo protector personal como camisa de manga larga y pantalón largo, goggles, mascarilla, gorra, guantes resistentes a productos químicos y botas. Manténganse perfectamente limpias y bien ventiladas las áreas de trabajo y el equipo limpio y en buen estado. Mientras se hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA. LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA) DE AMIFAC AL TEL. 01 (55) 5595-6659 ó 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 00 928 00 las 24 horas del día.

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado. Consiga atención médica.

En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos. Si se desarrolla irritación, consiga atención médica.

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado. Proporcione atención médica.

En caso de ingestión: Enjuagar la boca inmediatamente y beber posteriormente abundante agua. Consiga atención médica. Nunca induzca el vómito ni administrar nada por boca si la víctima está inconsciente o padece convulsiones.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo químico: El grupo químico al que pertenece **Phantom®** (clorfenapir) es el grupo de los Pyrroles.

Signos y síntomas de intoxicación: Causa moderada pero temporal irritación en ojos, moderada irritación en piel. Puede provocar daño severo si se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel.

Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación deberá aplicarse tratamiento sintomático.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE LOS POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM. DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)”.

“ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

Garantía

Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o cualquier otra ley relacionada y validado por ensayos de campo se ha demostrado que este producto aplicándolo de acuerdo a nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados, por lo que BASF garantiza la composición porcentual de la etiqueta y se hace responsable sólo respecto de la calidad constante del producto. Dado que el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, renunciamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del mal uso y almacenamiento.



“APLICACIÓN URBANA”



CONTROL DE TERMITAS

clorfenapir

Insecticida – Suspensión Concentrada / Grupo químico de los pyrroles

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:

Clorfenapir: 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etoximetil-5-trifluorometil pirrol-3-carbonitrilo (Equivalente a 240 g de i.a./lt)No menos de21.44%

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, estabilizador, antiespumante, anticongelante, preservador, agente de suspensión, espesante, neutralizador y solvente (agua)No más de78.56%
 Total100.00%

REG: RSCO-URB-INAC-0102A-303-064-021

CONTENIDO NETO: 10X1 L



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:
BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
 AV. INSURGENTES SUR 975,
 COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
 C.P. 03710, MÉXICO, D.F.
 TEL: 01 (55) 5325-2600

“HECHO EN E.U.A.”
ENVASADO EN MÉXICO
 © Marca registrada de BASF

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD

No. de lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad:
 2 años después de su fabricación.

SAP 68651 229 REV ENERO/2012

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Phantom® es un insecticida que puede aplicarse en: alcantarillas, zoológicos, tiendas de mascotas, hoteles, restaurantes, plantas industriales, oficinas, supermercados, escuelas, casas, edificios, almacenes, hospitales, barcos, ferrocarriles, camiones e instalaciones procesadoras de alimentos. Actúa por ingestión y contacto en las siguientes plagas:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Termitas: Subterráneas	<i>Reticulitermes spp.</i> , <i>Zootermopsis spp.</i> , <i>Heterotermes spp.</i> , <i>Coptotermes spp.</i>	El objetivo de tratar la tierra con Phantom® es establecer una barrera tratada (horizontal y/o vertical según sea necesario) entre la madera y otro material celuloso en la estructura y las poblaciones de termitas en el suelo. Para situaciones típicas de tratamiento aplique una concentración del 0.125 % (500 ml de Phantom® en 86 lt de agua). Cuando haya infestaciones severas aplique una concentración de 0.25% (1.0 lt de Phantom® en 86 lt de agua)
De la madera seca	<i>Marginitermes hubbardi</i> <i>Cryptotermes spp</i> <i>Kaloterms spp</i>	También provee control localizado de termitas subterráneas en sus galerías expuestas sobre la tierra, obreras o nidos aéreos sobre las estructuras de madera, dependiendo del nivel de infestación aplique las dosis antes mencionadas en espacios vacíos o canales en maderas dañadas de la estructura o en otros lugares vulnerables a ser atacados por termitas, localice las aperturas existentes o barre la cavidad infestada e inyecte la dosis preparada a baja presión utilizando el equipo apropiado.
De nidos acartonados	<i>Nasutitermes spp.</i>	Los tratamientos repetidos pueden hacerse localizados o completos. De ser necesario cada 4 semanas o más para mantener un control adecuado.
Cucarachas: Germánica De bandas café Café Oriental Americana	<i>Blatella germanica</i> <i>Supella supellectilium</i> <i>Periplaneta fuliginosa</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	Aplique una dilución de 0.5% (230 ml en 10 lt de agua) como un rocío grueso localizado de baja presión en grietas y hendiduras donde éstas plagas habitan comúnmente o suelen infestar. También las aplicaciones pueden hacerse en superficies debajo de muebles, espacios entre juntas de muebles, detrás de fregaderos, armarios, plomería, gabinetes u otras áreas donde puedan esconderse las cucarachas. De ser necesario vuelva a aplicar cada 4 semanas.
Hormigas: Cosechadora De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña hormiga del fuego Doméstica Carpintera	<i>Pogonomirmex sp</i> <i>Solenopsis spp.</i> <i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium sp</i> <i>Wasmania auropunctata</i> <i>Tapinoma spp.</i> <i>Camponotus spp.</i>	Aplique una dilución de 0.5% (230 ml en 10 lt de agua) en grietas, hendiduras donde las plagas habitan comúnmente, de ser posible aplique directamente a los nidos de las hormigas. De ser necesario vuelva a aplicar cada 4 semanas.

Los intervalos de aplicación deben ser superiores a cuatro semanas.

OTRAS PLAGAS		
Moscas: Mosquitos: Avispas: Pulgas: Chinches: Chinche de cama: Pescadito de plata: Grillo: Cochinillas: Tijerilla: Alacranes: Arañas: Ciempíes: Gorgojos:	<i>Musca domestica.</i> , <i>Fannia spp.</i> , <i>Drosophilla spp.</i> <i>Culex spp.</i> , <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> <i>Vespula spp.</i> <i>Xenopsylla spp.</i> , <i>Ctenocephalides spp</i> <i>Triatoma spp.</i> , <i>Rhodnius prolixus</i> <i>Cimex spp.</i> <i>Lepisma spp.</i> <i>Acheta domesticus</i> <i>Isopoda</i> <i>Forticula auricularia</i> <i>Centruroides spp.</i> <i>Latrodectus mactans</i> , <i>Loxosceles spp.</i> <i>Quilópodos y diplópodos</i> <i>Tribolium castaneum</i> , <i>Sitophilus oryzae</i> , <i>Trogoderma granarium</i> , <i>Tenebroides sp.</i>	Aplique una dilución de 0.5% (230 ml en 10 lt de agua) como un rocío grueso localizado de baja presión en grietas y hendiduras donde éstas plagas habitan comúnmente o suelen infestar.

Método para preparar y aplicar el producto.

- Las mezclas deben de hacerse de la siguiente manera:
- Vacíe el agua en el tanque hasta ¾ partes de la requerida.
 - Mida la cantidad de **Phantom®** necesario.
 - Añada **Phantom®** al tanque y llene con el resto de agua.
 - Cierre el aspersor y agite para conseguir una suspensión apropiada
 - Vuelva agitar el aspersor antes de volver a usarlo si se interrumpe momentáneamente el tratamiento.

Contraindicaciones.

No aplique **Phantom®** durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. Debe de aplicarse sólo, no se recomienda su uso en mezcla con otros plaguicidas.



Precaución

